

FICHA TÉCNICA

Algevit



Bioestimulante no microbiano y fertilizante

Ascophyllum nodosum y óxido de potasio

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial

ALGEVIT

Clasificación

Bioestimulante no microbiano y fertilizante

Composición

Concentración	p/p	p/v
Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>	30%	35%
Ácido algínico	1,5%	1,7%
Manitol	0,5%	0,58%
Óxido de potasio (K ₂ O)	3,9%	4,5%

Parámetros fisicoquímicos

Densidad a 20 °C	1.170 g/L
Materia Seca	31%
pH	6,1
Solubilidad a 20 °C	100%

Formato del producto

Envase con contenido neto de 20 Litros.

Datos del fabricante y formulador

MIRAT BIOSCIENCE S.L.U.

Datos importador y comercializador

GRANOS Y PRODUCTOS SUR SPA

GRAPRO SUR

Av. Las Industrias 9725, Los Ángeles, Chile.



RECOMENDACIONES DE USO

Funciones	Potencia el desarrollo radicular y la microbiota: Aplicado al suelo estimula la formación de raíces finas y mejora el entorno microbiano, promoviendo una mejor estructura del suelo y absorción de agua y nutrientes. Aumenta la tolerancia al estrés abiótico: Actúa como modulador fisiológico, ayudando a los cultivos a resistir mejor condiciones adversas como sequía, salinidad y temperaturas extremas. Mejora la calidad y el rendimiento: Plantas más vigorosas, con mejor cuaja, llenado de fruto y firmeza, factores clave para la calidad comercial y vida postcosecha
Forma de aplicación	Aplicación foliar o al suelo por fertirriego o drench.

RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR POR CULTIVO

ESPECIE	Dosis aplicación		Momento de aplicación
Frutales: Carozos (cerezos, nectarín, ciruelo, durazno), Palto, Kiwi, Olivo, Berries (arándanos, frambuesas, mora, frutilla), Avellano, Nogal, Manzanos.	200– 300 cc/hL	2 a 3 L/há	Floración, cuaja y desarrollo de frutos para mejorar crecimiento vegetativo y de frutos. En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde brotación a post cosecha.
Hortalizas: papa, tomate, lechuga.	500 cc/hL	2-3 L/há	En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde emergencia hasta precosecha.
Cultivos: Cereales (trigo, candeal, avena, etc.), Arroz.	500 cc/hL	2– 3 L/há	En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde macolla hasta hoja bandera.
Maíz	500 cc/hL	2– 3 L/há	En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) V3-V4 junto con fitosanitarios.



RECOMENDACIONES DE USO AL SUELO POR CULTIVO

ESPECIE	Tipo de aplicación	Dosis aplicación	Momento de aplicación
Frutales: Carozos (cerezos, nectarín, ciruelo, durazno), Palto, Kiwi, Olivo, Berries (arándanos, frambuesas, mora, frutilla), Avellano, Nogal, Manzanos.	Riego	5-10 L/há	En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde brotación a post cosecha. Mojamiento de acuerdo a la especie.

CONSIDERACIONES

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar el contacto con fuentes de ignición y mantener separado de sustancias incompatibles. Proteger de la luz solar directa. Conservar el envase herméticamente cerrado hasta el momento de su uso.
Sustancias y mezclas incompatibles	Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.
Fitotoxicidad	No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso.

Consultas

administracion@grapro-sur.cl

Ficha técnica válida para Chile.

Versión: 18082025

