

# Ecogreen



Enmienda orgánica, bioestimulante y fertilizante

Foliar y suelo

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial

ECOGREEN

Clasificación

Enmienda orgánica, fertilizante y bioestimulante no microbiano.

Composición

**Concentración****p/p****p/v**

Materia orgánica

40%

52%

C-Orgánico

23%

30%

Relación C/N

5,75

Ácidos fúlvicos

30%

39%

Nitrógeno total

4%

5%

Óxido de potasio (K<sub>2</sub>O)

3%

3,9%

Parámetros fisicoquímicos

Densidad a 20 °C

1.300 g/L

pH

5,0

Solubilidad a 20 °C

100%

Formato del producto

Contenido neto de 20 L o 1000 L, dependiendo del formato.

Datos del fabricante y formulador

MIRAT BIOSCIENCE S.L.U.

Datos del importador

GRANOS Y PRODUCTOS SUR SPA

GRAPRO SUR

Av. Las Industrias 9725, Los Ángeles, Chile.



## RECOMENDACIONES DE USO

### Funciones

Ecogreen es una enmienda orgánica formulada a partir de melazas de remolacha. Aporta una alta concentración de materia orgánica, nitrógeno y potasio. Además de contener sustancias bioestimulantes como ácidos fúlvicos, glicina betaina y aminoácidos ideales para aplicaciones foliares enfocadas en mitigar el estrés abiótico. Su uso continuo durante el fertirriego, beneficia la actividad microbiológica de los suelos, favorece el crecimiento radicular y desarrollo de las plantas.

### Forma de aplicación

Aplicación foliar o al suelo por fertirriego o drench.

## RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR POR CULTIVO

| ESPECIE                                                                                                        | Dosis aplicación |            | Momento de aplicación                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales:</b> Carozos (cerezos, nectarín, ciruelo, durazno), Palto, Kiwi, Olivo, Avellano, Nogal, Manzanos. | 300 cc/hL        | 3 – 4 L/há | En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde brotación a post cosecha.    |
| <b>Berries:</b> arándano, frambuesa, mora, frutilla.                                                           | 300 cc/hL        | 1,5-2 L/há | En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde brotación a post cosecha.    |
| <b>Hortalizas:</b> papa, tomate, lechuga.                                                                      | 500 cc/hL        | 2-3 L/há   | En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde emergencia hasta precosecha. |
| <b>Cultivos:</b> Cereales (trigo, canchal, avena, etc.), Arroz.                                                | 500 cc/hL        | 2– 3 L/há  | En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) aplicar desde macolla hasta hoja bandera.  |



|      |           |           |                                                                                                                       |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maíz | 500 cc/hL | 2– 3 L/há | En situación de estrés abiótico (baja o alta temperatura, radiación, déficit hídrico) V3-V4 junto con fitosanitarios. |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECOMENDACIONES DE USO AL SUELO POR CULTIVO

| ESPECIE                                                                                                                                                         | Tipo de aplicación | Dosis aplicación | Aplicaciones por temporada | Momento de aplicación                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales:</b> Carozos (cerezos, nectarín, ciruelo, durazno), Palto, Kiwi, Olivo, Berries (arándanos, frambuesas, mora, frutilla), Avellano, Nogal, Manzanos. | Riego              | 15 a 20 L/há     | 2                          | Aplicar con peak de crecimiento radicular.                              |
|                                                                                                                                                                 | Riego              | 10 L/há          | 1 a 2                      | Aplicar previo a enero para mejorar humedad aprovechable del suelo.     |
|                                                                                                                                                                 | Riego              | 1 – 2 L/há       | No aplica                  | Incorporar previo, junto o post aplicaciones de consorcios microbianos. |

## CONSIDERACIONES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento      | Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar el contacto con fuentes de ignición y mantener separado de sustancias incompatibles. Proteger de la luz solar directa. Conservar el envase herméticamente cerrado hasta el momento de su uso. |
| Sustancias y mezclas incompatibles | Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.                                                                                                                                                                                                    |
| Fitotoxicidad                      | No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso.                                                                                                                                                                                                            |

## Consultas

[administracion@graprosur.cl](mailto:administracion@graprosur.cl)

Ficha técnica válida para Chile.

Versión: 18082025

