

KYPRION

Cobre complejoado con ácido heptagluónico

Foliar y suelo

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial

KYPRION

Clasificación

Fertilizante inorgánico

Composición

Concentración**p/p****p/v**

Cobre total

5,5%

7%

Cobre complejoado

5,5%

7%

Agente complejante

Ácido heptagluónico

Parámetros fisicoquímicos

Densidad a 20 °C

1.300 g/L

pH

5,0

Solubilidad a 20 °C

100%

Formato del producto

Contenido neto de 5 litros.

Datos del fabricante y formulador

MIRAT BIOSCIENCE S.L.U

Datos del importador

GRANOS Y PRODUCTOS SUR SPA

GRAPRO SUR

Av. Las Industrias 9725, Los Ángeles, Chile.



RECOMENDACIONES DE USO

Funciones	Cobre soluble y de fácil asimilación. Permite mejorar los procesos enzimáticos, ahorrando costes energéticos haciendo más eficiente la fotosíntesis. Promueve la síntesis de lignina permitiendo la cicatrización de heridas de forma más rápida.
Forma de aplicación	Aplicación foliar o al suelo por fertirriego o drench.

RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR POR CULTIVO

ESPECIE	Dosis aplicación		Nº aplicaciones	Momento de aplicación
Frutales: Carozos (cerezos, nectarín, ciruelo, durazno), Manzanos.	300 cc/hL	3 – 4 L/há	1 a 3	Durante primavera desde yema hinchada. Luego en inicio de caída de hojas.
Avellano europeo	300 cc/hL	3 – 4 L/há	1 a 3	Inicio caída de hojas, floración y en primavera desde brotación.
Nogal	300 cc/hL	3 – 4 L/há	1 a 3	Inicio caída de hojas y en primavera desde brotación.
Kiwi	300 cc/hL	3 – 4 L/há	1 a 2	Brotación y con botón floral visible.
Berries: arándano, frambuesa, mora, frutilla.	300 cc/hL	1,5-2 L/há	1 a 3	Durante primavera desde yema hinchada. Luego en inicio de caída de hojas.
Hortalizas: papa, tomate, lechuga.	500 cc/hL	2-3 L/há	2 a 4	Durante la primera fase con plantas emergidas de 10 cm en adelante. Repitiendo cada 15 días.



RECOMENDACIONES DE USO AL SUELO POR CULTIVO

ESPECIE	Tipo de aplicación	Dosis aplicación	Aplicaciones por temporada	Momento de aplicación
Frutales	Riego	3 a 5 L/há	1 a 2	En suelos con bajo contenido de cobre, aplicar en primavera y/o post cosecha.

CONSIDERACIONES

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar el contacto con fuentes de ignición y mantener separado de sustancias incompatibles. Proteger de la luz solar directa. Conservar el envase herméticamente cerrado hasta el momento de su uso.
Sustancias y mezclas incompatibles	No mezclar con fuentes de reacción altamente alcalinas.
Fitotoxicidad	No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso.

Consultas

administracion@grapro-sur.cl

Ficha técnica válida para Chile.

Versión: 18082025

