

FICHA TÉCNICA



Estrés abiótico: Control de daño solar, estrés térmico e hídrico.

Foliar y suelo

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	REDOX		
Clasificación	Bioestimulante en polvo.		
Composición	Concentración	p/p	g/kg
	Ácidos orgánicos vegetales	12%	120
Parámetros fisicoquímicos	Densidad a 20 °C	26 g/L	
	pH	4,5	
	Solubilidad a 20 °C	2,5 g/L	
Formato del producto	Envase con contenido neto de 250 g.		
Fabricado por	NUTRIPROVE S.A.		
	Jardín Esmeralda 39, Talca, Chile.		
Distribuido por	GRANOS Y PRODUCTOS SUR SPA		
	Av. Las Industrias 9725, Los Ángeles, Chile.		

RECOMENDACIONES DE USO

Funciones	El producto está orientado al control de daño por sol y estrés térmico e hídrico. Dentro de sus atributos: esta la mejora en la eficiencia del uso del agua; mejoras en grados Brix / TSS; reducción de aborto floral; reducción de cerezas siamesas y reducción stress hídrico; frutos de mejor calidad; reducción en la caída de frutos; reducción de la alternancia de producción; aumento de rendimiento y calidad asociado a una mejora en la fitosanidad del cultivo.
Forma de aplicación	Aplicación foliar o al suelo.



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR POR CULTIVO

Especie	Dosis aplicación	N° aplicaciones	Momento de aplicación
Pomáceas: Manzano y peral.	250 g/há	6 – 8	Comenzar aplicaciones con fruta de tamaño 30 mm. Aplicar cada 15 - 21 días según susceptibilidad de la variedad y condiciones ambientales.
Carozos: Cerezo, ciruelo, durazno y nectarino.	250 g/há	2 – 3	Realizar aplicaciones cada 15 – 21 días según condiciones ambientales.
Avellano europeo, Nogal	250 g/há	2— 3	Realizar aplicaciones cada 15— 21 días según condiciones ambientales.
Berries: arándano, frambuesa, mora, frutilla.	250 g/há	3– 4	Aplicar cada 10 – 15 días desde crecimiento de fruto y según condiciones ambientales.
Uva de mesa	250 g/há	3 – 5	Aplicar desde cuajado de bayas cada 15 – 21 días según condiciones ambientales.
Cítricos: Clementinas, limoneros, mandarinos, naranjos y pomelos.	250 g/há	2– 3	Aplicar con intervalos de 15 a 21 días según condiciones ambientales.

IMPORTANTE: Se requiere el uso de surfactantes para lograr una mejor distribución sobre la hoja, se recomiendan surfactantes no iónicos u órgano-siliconados. Se recomienda aplicaciones a pH levemente ácido a neutro (pH 5,5 a 7,0).



FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES Y CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Al manipular el producto debe utilizar guantes, mascarilla, antiparras y traje protector completo o impermeable. Evitar contacto con la piel y ojos; si fuese así: lavar con abundante agua. Si es ingerido o inhalado acudir inmediatamente al médico.
2. El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, con su respectiva etiqueta, en un lugar fresco, seco y de acceso restringido.
3. No coma, no beba ni fume al manipular el producto.
4. Para evitar contaminación elimine el envase después de haber realizado un triple lavado y de acuerdo a la Normativa vigente.
5. En condiciones climáticas extremas de lluvia abstenerse del uso de este producto.
6. Después de manipular el producto lavarse manos, cara, o cualquier zona expuesta.
7. No almacenar ni transportar junto a alimentos de uso humano o animal.
8. Para obtener un buen empleo, se debe: a) Leer en forma completa la etiqueta. b) Agitar vigorosamente el envase antes de vaciar al estanque de aplicación y mantener funcionando el estanque constantemente. c) Usar el volumen de agua adecuado según dosis establecidas en la etiqueta.
10. **Redox** es compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomiendan pruebas previas de compatibilidad.
11. Mantener fuera del alcance de los niños.

NUTRIPROVE®
Nutrición y protección vegetal



Consultas

administracion@grapro-sur.cl

Ficha técnica válida para Chile.

Versión: 18082025

